

お取引先 様

ジェーピーエス製薬

五苓黄解内服液
【使用上の注意】改訂のお知らせ

平成 30 年 2 月 13 日付け薬生安発 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長より使用上の注意改訂の通知がありました。本通知に基づいて、「使用上の注意」を下記のように改訂致しますのでご了承いただきますようお願い申し上げます。

また、この製品のご販売に際しましては、改訂内容をお客様に十分にご説明いただきますようお願い申し上げます。

なお、改訂内容を反映した製品がお客様のお手元に届くまでには、流通在庫の関係から若干のずれが生じることがあると存じますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

記

【「使用上の注意」の改訂内容】

下線部は改訂箇所

改訂前	改訂後				
<p>「相談すること」 2. 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合 は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師 又は登録販売者に相談してください</p>	<p>「相談すること」 2. <u>服用後、次の症状があらわれた場合は副作用 の可能性がある</u>ので、直ちに服用を中止し、<u>この 製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談 してください</u> <u>まれに下記の重篤な症状が起こることがありま す。その場合は直ちに医師の診療を受けてくださ い。</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">症状の名称</th> <th style="text-align: center;">症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><u>腸間膜静脈硬 化症</u></td> <td style="text-align: center;"><u>長期服用により、腹痛、下痢、 便秘、腹部膨満等が繰り返し あらわれる。</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>3. <u>1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合 は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師 又は登録販売者に相談してください</u></p> <p>4. <u>長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登 録販売者に相談してください</u></p>	症状の名称	症状	<u>腸間膜静脈硬 化症</u>	<u>長期服用により、腹痛、下痢、 便秘、腹部膨満等が繰り返し あらわれる。</u>
症状の名称	症状				
<u>腸間膜静脈硬 化症</u>	<u>長期服用により、腹痛、下痢、 便秘、腹部膨満等が繰り返し あらわれる。</u>				

以上